

# 平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

確認者印



生産者No.	J0035	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	258 a
圃場筆数	9筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/18, 9/6

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫

## 《 耕種概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	JA 種子もみ	110 Kg 確認済		
	JA 以外 種子もみ			
	JA 以外 苗			
播種月日(月/日)	4/20~4/24			
育苗様式	中苗			
本田管理	時期(月/日)	5/20~5/24		
	植付株数	50 株/坪		
	生育調整			
	清切り(月/日)	6/25~6/27		
	中干し(月/日)	6/25		
	出穂期(月/日)	8/ 5		
	倒伏			
	程度	無		
	收穫			
	時期(月/日)	9/16~9/25		
生育期間での除草剤使用	未使用	確認済		
作業形態	自己			
乾燥・調製				
選別網目	1.90 mm	確認済		
10a当たり収量	570 Kg			
1等米比率	100 %			
作柄・品質	月/日	出荷量 (30kg個)	検査 等級	玄米タンパク値 (%)
	09/20	117	1等	5.9
	09/21	59	1等	5.7
	09/21	72	1等	5.7
	09/24	108	1等	5.7
	09/27	55	1等	5.5
	09/27	48	1等	5.2
	09/28	52	1等	5.5
計	511		5.6	

## 《 農薬資材使用概要 》

区分	資材名	使用 時期 (月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分 回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	種子殺菌						
	苗殺菌						
本田	タチガレン粉剤	4/20	6g		床土混和	1	ヒドロキシインキサゾール
	カスミン液剤	4/20	4倍		50ml 灌注	0	カスガマイシン-塩酸塩 (カウンタなし)
初期殺菌殺虫	側条リゼマトスタークル顆粒水和剤	5/20		500g	ベスト肥料混和	2	プロベナゾール, ジノテフラン
	ヤイバ豆つぶ250	5/27		250g	散布	2	フェントラザミドピリミスルファン
除草剤							
後期殺菌	ブラシジョーカーFロアブル	8/ 9		1000倍	100リッター 散布	3	フェリムグンフライト, シアワホステン
後期殺虫							
計						8	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 4.3割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

## 《 肥料資材使用概要 》

区分	資材名	使用 時期 (月/日)	使用量		10a当たり成分量 (Kg)				
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他
					全量	内化学合成			
基肥	魚沼培土		2800g	56 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03	ホーホク培土同様に肥料使用
育苗									
追肥									
土じり									
基肥	魚沼ロマンベストS220	5/20		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00	
	なたね油粕	5/ 9		30 Kg	1.50	0.00	0.60	0.30	
本田									
調整肥									
種肥	魚沼ロマン有機種肥	7/19		20 Kg	2.00	1.26	0.80	2.40	
計						4.74			

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)