

平成24年産 津南町認証米 栽培管理記録簿

農林水産省新ガイドライン基準適合栽培

新潟県津南町慣行栽培基準に対し、節減対象農薬の使用回数及び肥料の化学合成チッソ成分量が5割以下

生産者 No.	J0044	品種名	コシヒカリBL	栽培面積	114 a
圃場筆数	10筆	栽培協定	済	圃場設置及び管理 現地確認月日(月/日)	7/23, 9/11

栽培及び確認責任者 津南町農業協同組合 営農部 営農センター

最終確認 平成24年11月20日 湯沢利夫



《 耕種概要 》

《 農薬資材使用概要 》

《 肥料資材使用概要 》

区分	内容	附記		
育苗管理	種子更新	確認済 温湯済		
	JA 種子もみ	28 Kg 確認済		
	JA 以外 種子もみ			
	播種月日(月/日)	4/22		
本田管理	育苗様式	中苗		
	田植 時期(月/日)	5/25		
	田植 植付株数	50 株/坪		
	生育調整 溝切り(月/日)	なし		
	生育調整 中干し(月/日)	6/30~7/18		
	出穂期(月/日)	8/10~8/12		
	倒伏 時期			
	倒伏 程度	無		
	收穫 時期(月/日)	9/16~9/27		
	生育期間での畦畔への除草剤使用	未使用	確認済	
乾燥調整	作業形態	自己		
	選別網目	1.90 mm 確認済		
作柄・品質	10a当たり収量	514 Kg		
	1等米比率	100 %		
	月/日	出荷量(30kg個)	検査等級	玄米タンパク値(%)
	09/24	45	1等	5.8
	09/28	75	1等	5.8
計	120		5.8	

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量または倍率		処理方法	成分回数	成分名
			箱当たり	10a当たり			
育苗	タフブロック	4/20	200倍		24時間浸漬	0	タロマイセスフラバス(カウントなし)
	タチガレン液剤	4/22	1000倍		1.0リッター 床土灌注	1	ヒドロキシシソキサゾール
初期殺菌殺虫	Dr.オリベスターク箱粒剤	5/25	50g		苗箱施用	2	プロベナゾール ジノテフラン
	ヤイバ豆つぶ250	5/31	250g		散布	2	フェントラザミドピリミルファン
除草剤	撒粉ボルドー粉剤DL	7/27		3Kg	散布	0	塩基性硫酸銅
	ブラシンゾル	8/14		8倍	0.8リッター ラジヘリ散布	2	フェリムゾンフラサイド
	MRジョーカーEW	8/14		16倍	0.8リッター ラジヘリ散布	1	シラフルオフェン
	計					8	

①

農薬使用成分回数 慣行栽培基準比 4.3割 (①÷慣行栽培基準19成分回数)

区分	資材名	使用時期(月/日)	使用量		10a当たり成分量(Kg)					
			箱当たり	10a当たり	チッソ		りん酸	カリ	その他	
					全量	内化学合成				
基肥	ホーネンス培土		2600g	52 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03		
	べんとう肥		15g	0.3 Kg	0.03	0.03	0.03	0.03		
追肥	魚沼ロマンソイルキーパー	5/10		50 Kg	0.00	0.00	3.00	2.00	アルカリ18.0%(けい酸23.0% 苦土4% 炭酸3%)	
	魚沼ロマンベストS220	5/25		30 Kg	3.60	3.45	3.60	3.00		
基肥	なたね油粕	5/13		50 Kg	2.50	0.00	1.00	0.50		
	粒状発酵けい黄	5/13		60 Kg	1.20	0.00	3.90	1.80		
調整肥	魚沼ロマン有機穂肥	7/24		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20		
	魚沼ロマン有機穂肥	7/31		10 Kg	1.00	0.63	0.40	1.20		
計					4.77					

②

肥料化学合成チッソ成分量 慣行栽培基準比 4.8割 (②÷慣行栽培基準10Kg/10a)